



بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

مراقبت های بعد از عمل ختنه

تهیه کننده: خدیجه زارع

تاریخ تهیه: تابستان 95

تاریخ بازبینی: پاییز 1396

تأیید کننده علمی: جناب آقای دکتر پایدار

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ تروما

زیر نظر واحد بهبود کیفیت

جهت بیماران



راهنمایی بالینی ختنه

در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای اسلامی این عمل شایع ترین عمل جراحی است که اکثرا در دوران نوزادی انجام میشود. ختنه در نوزادان با وزن کمتر از 2/5 کیلوگرم، ناهنجاری های ارثی آلت تناسلی و در نوزادان چاق و مبتلا به فتق های بزرگ و کودکانی که اختلالات انعقادی دارند تا اصلاح و درمان این موارد نباید انجام شود. تجویز آنتی بیوتیک لزومی ندارد و برای تسکین درد از قطره یا شیاف استامینوفن کودکان با دوز متناسب وزن می توان استفاده کرد. لازم است که در صورت خونریزی و یا هر گونه مشکلی در کیفیت ادرار نوزاد معاینه مجدد انجام شود.

در خصوص زمان انجام ختنه نظرات متعددی وجود دارد. بر اساس منبع ذکر شده متخصصین نوزادان، بهترین زمان مناسب ختنه از حداقل 6 ساعت پس از تولد و پس از معاینه اول نوزاد تا پیش از ترخیص از بیمارستان و حداکثر تا پایان دوره نوزادی (28 روز اول زندگی) می باشد. مشروط بر

اینکه نوزاد سالم باشد و وزن بالای 2500 گرم داشته باشد و مشکلات عدیده و خاص (مثل ناهنجاریهای مجرا و بیماریهای خونریزی دهنده در فامیل وجود نداشته باشد)



مراقبت های بعد از عمل ختنه:

- 1- حداقل 2 ساعت پس از انجام ختنه تحت نظر باشد.
- 2- محل ختنه بایستی دور از آلودگی مدفوع نگهداشته شود و بهتر است در چند روز اول، آلودگی با آب و صابون تمیز شود.

3- استفاده از پماد تترا سایکلین و وازلین طبی
روی حلقه یا آلت روزی 3 بار یا بیشتر
4- حداقل 7 روز پس از ختنه توسط پزشک
دیده شود.

5- در صورت بی قراری فرزندان تجویز قطره
استامینوفن (2 قطره به ازای هر کیلو گرم
وزن بدن)

6- پوشک نوزاد حتی المقدور باز باشد و در
صورت بستن ، سفت بسته نشود.

**در صورت مشاهده علائم ذیل به پزشک مراجعه
نمائید:**

- 1- خونریزی یا تغییر رنگ و تیره شدن نوک
آلت و خونمردگی وسیع آلت و بیضه
- 2- توم شدید آلت و بیضه
- 3- نوزاد بایستی حداکثر تا 24 ساعت پس از
ختنه ادرار نماید در غیر اینصورت نیاز به
مراجعه به پزشک می باشد
- 4- عفونت محل ختنه (قرمزی موضعی و
ترشح چرکی)
- 5- سایر مواردی که به نظر والدین غیر طبیعی
باشد.

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنب بیمارستان چمران-
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریتهای
پزشکی شهید رجایی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: 36364001

سایت: WWW.rajaeehosp.ac.ir، لینک آموزش به بیمار

منابع:

Medscape/medicine/1015820-clinical
www.emedicinehealth.com/script/main
www.kangavarhosp.kumc.ac.ir/moraghebat

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای فرزند شما