

شایط نمونه بینی کشت خون نیاز دستگاه

۱- ابتدا محل خونگیری را با الکل 70° استریل کنید.

۲- سپس محل خونگیری را با *povidone-iodine* استریل نمائید و اجازه دهید تا مدت یک دقیقه بر سطح پوست بماند.

۳- در مرحله بعد از الکل 70° استفاده شود تا اثر بتادین قبلی از بین برود.

رعایت نکات فوق برای گرفتن نمونه کشت خون الزامی است درصورتیکه برای نمونه گیری نیاز به لمس سیاهرگ باشد بایستی انگشتان لمس کننده استریل شود و یا از دستکش استریل استفاده گردد.

۴- به هیچ عنوان از بتادین برای استریل کردن سرتیوب ها استفاده نشود اما از الکل 70° برای استریل کردن سرتیوب می توان استفاده کرد و حتماً باید نیدل سرنگ هم تعویض گردد.

۵- شیشه کشت خون را هر چه سریعتر به آزمایشگاه ارجاع دهید به هیچ وجه نبایستی شیشه کشت خون را پس از تلقیح در یخچال قرار داد و دمای محیط کافی است.

۶- برای بدست آوردن بهترین جواب بایستی حجم خون تلقیح شده مطابق با مقادیر ذکر شده برروی شیشه های کشت خون باشد.

مقادیر خون ببرد از قدم	
1-3 ml	کشت خون برای اطفال (peds plus/f)
8-10 ml	کشت خون بزرگسالان (Aerobic/f)

۷- لطفاً نام بیمار را بر روی بارک تیوبها نچسبانید زیرا برای وارد کردن تیوبها به دستگاه از

بارک روی تیوبها استفاده می شود.

۸- در صورت امکان برای گرفتن نمونه خون از کاترهاي شرياني يا وريدي استفاده نشود.

با تشکر مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
بیمارستان همیرانی